

FORTTRANS

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiednio stosując środki przeczyszczające (**FORTTRANS**). Prawidłową reakcją na lek będzie biegunka.

	<i>Gdy badanie jest rano</i>		<i>Gdy badanie jest po południu</i>	
	<i>Dieta</i>	<i>FORTTRANS</i>	<i>Dieta</i>	<i>FORTTRANS</i>
Tydzień przed badaniem	Nie spożywać: - warzyw i owoców z pestkami (kiwi, maliny), - ziaren (siemię lniane, mak itp.), - ciemnego pieczywa, - napojów gazowanych.	Dni bez leku przeczyszczającego.	Nie spożywać: - warzyw i owoców z pestkami (kiwi, maliny), - ziaren (siemię lniane, mak itp.), - ciemnego pieczywa; - napojów gazowanych.	Dni bez leku przeczyszczającego.
2 dni przed terminem badania	Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata. Lekkostrawna kolacja: herbata, jasne pieczywo, miód, ser, chuda wędlina.		Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata. Lekkostrawna kolacja: herbata, jasne pieczywo, miód, ser, chuda wędlina.	
1 dzień przed terminem badania	Bez śniadania	1. saşetka 9:00 – 11.00	Lekkostrawne śniadanie: herbata, jasne pieczywo, ser, miód, chuda wędlina; bez kawy.	-----
	Należy pić ok. 2 litrów wody, herbaty, jasnych soków: Można ssać landrynki, jeść miód i kisiel bez kawałków owoców. Nie należy pić: mleka, kefirów, jogurtów, alkoholu ani kawy.	2. saşetka 12:00 – 14.00	Należy pić ok. 2 litrów wody, herbaty, jasnych soków: Można ssać landrynki, jeść miód i kisiel bez kawałków owoców. Nie należy pić: mleka, kefirów, jogurtów, alkoholu ani kawy.	1. saşetka 11:00 – 13.00
		3. saşetka 15:00 – 17.00		2. saşetka 14:00 – 16.00
		4. saşetka 18:00 – 20.00		3. saşetka 17:00 – 19.00
W dniu badania	Osoby, regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę normalnie. Na 2 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować już żadnych płynów.	Do czasu badania nie spożywać pokarmów! Po badaniu można jeść według zaleceń lekarza wykonującego badanie.	Osoby, regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę normalnie.	4. saşetka 7:00 – 9.00
			Na 2 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować już żadnych płynów.	Do czasu badania nie spożywać pokarmów! Po badaniu można jeść według zaleceń lekarza wykonującego badanie.

DODATKOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE POD NR TELEFONU 89-532-45-60 oraz 89-532-45-61