

**PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII
MOVIPREP**

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiednio stosując środki przeczyszczające (MOVIPREP). Prawidłową reakcją na leki będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną.

	Gdy badanie rano (do godz. 14)		Gdy badanie po południu (do godz. 14)	
	Dieta	MOVIPREP	Dieta	MOVIPREP
Już tydzień przed badaniem	Nie spożywać: - warzyw i owoców pestkowych (np.kiwi); - pestek i ziaren (siemię lniane, mak itp.); - ciemnego pieczywa; - napojów gazowanych.		Nie spożywać: - warzyw i owoców pestkowych (np.kiwi); - pestek i ziaren (siemię lniane, mak itp.) ; - ciemnego pieczywa; - napojów gazowanych.	
2 dni przed terminem badania	Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata.	Dni bez leku przeczyszczającego.	Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata.	Dni bez leku przeczyszczającego.
	Lekkostrawna kolacja: herbata, jasny chleb lub bułka, dżem, ser, chuda wędlna itp.		Lekkostrawna kolacja: herbata, jasny chleb lub bułka, dżem, ser, chuda wędlna itp.	
1 dzień przed terminem badania	Bez śniadania. Posiłek można spożyć dopiero po badaniu.	Godz. 15:00 -przygotuj 1 litr wody (przegotowana lub mineralna); - rozpuść w nim zawartość saszetki A i B; - wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia proszku; - przygotowany preparat wypij w ciągu 30-60 minut; - wypij jeszcze 1 litry wody w ciągu kolejnej godziny.	Lekkostrawne śniadanie: herbata, jasny chleb lub bułka, dżem, ser, chuda wędlna Kolejny posiłek można spożyć dopiero po badaniu.	Godz. 16:00 -przygotuj 1 litr wody (przegotowana lub mineralna); - rozpuść w nim zawartość saszetki A i B; - wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia proszku; - przygotowany preparat wypij w ciągu 30-60 minut; - wypij jeszcze 1 litry wody w ciągu kolejnej godziny.
	Należy pić ok. 2 litrów wody, herbaty, jasnych soków; Można ssać landrynki, jeść miód i kisiel bez kawałków owoców; Nie powinno się pić mleka, kefirów, jogurtów i kawy.	Godz. 17:00 POWTÓRZ powyższe czynności z drugą dawką leku MOVIPREP.	Należy pić ok. 2 litrów wody, herbaty, jasnych soków; Można ssać landrynki, jeść miód i kisiel bez kawałków owoców; Nie powinno się pić mleka, kefirów, jogurtów i kawy.	
W dniu badania	<i>Osoby, regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę normalnie.</i>	Do czasu badania nie spożywać pokarmów! Po badaniu wg zaleceń lekarza wykonującego badanie.	<i>Osoby, regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe zażywają poranną dawkę normalnie.</i>	Godz. 8:00 POWTÓRZ powyższe czynności z drugą dawką leku MOVIPREP. Do czasu badania nie spożywać pokarmów! Po badaniu wg zaleceń lekarza wykonującego badanie.
	Na 2 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować już żadnych płynów.		Na 2 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować już żadnych płynów.	

NA KILKA DNI PRZED BADANIEM PO KONSULTACJI Z LEKARZEM RODZINNYM POWINNO SIĘ ODSTAWIĆ LEKI WPLYWAJĄCE NA KRZEPLIWOŚĆ KRWI (np.: Acenocumarol, Warfin, Acard).