

FORTTRANS
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiednio stosując środki przeczyszczające (**FORTTRANS**). Prawidłową reakcją na lek będzie biegunka.

Ważne zalecenia dietetyczne:

- **7 dni przed badaniem:**
 - nie spożywać warzyw i owoców z pestkami (kiwi, maliny, truskawki, pomidory, itd.), ziaren (siemię lniane, mak), pieczywa z ziarnem, napojów gazowanych;
- **2 dni przed badaniem:**
 - dieta półpłynna, lekkostrawna, tj. ryż, makaron, jasne pieczywo, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata;
 - kolacja lekkostrawna: jasne pieczywo, ser, chuda wędlna, herbata;
- **1 dzień przed badaniem:**
 - nie należy pić: alkoholu, herbaty ani kawy;
 - nie można spożywać żadnych posiłków stałych. Dozwolona jest tylko woda, jasne, klarowne soki niegazowane, jasny kisiel, przecedzony rosół;
- **Dzień badania:**
 - nie spożywać żadnych pokarmów do czasu badania!
 - dwie godziny przed badaniem nic nie pić!

Jak przygotować preparat FORTTRANS:

- 1 saszetkę rozpuścić w 1 litrze wody niegazowanej. Wypić w ciągu 1 godziny.

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Do godz. 10.00	1.saszetka: godz. 18.00 2.saszetka: godz. 19.00 3.saszetka: godz. 20.00 4.saszetka: godz. 21.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	Bez leku przeczyszczającego Można pić wodę

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Godz. 10.00-14.00	1.saszetka: godz. 19.00 2.saszetka: godz. 20.00 3.saszetka: godz. 21.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	4.saszetka: godz. 5.00

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Po godz. 14.00	1.saszetka: godz. 20.00 2.saszetka: godz. 21.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	3.saszetka: godz. 8.00 4.saszetka: godz. 9.00

Osoby przyjmujące:

- regularnie leki zażywają normalnie poranną dawkę,
- leki wpływające na krzepliwość krwi (np.: Acenocumarol, Plavix, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Warfin, Sintrom, Acard, Polocard) po konsultacji z lekarzem rodzinnym powinny odstawić je na kilka dni,
- żelazo powinny odstawić je na 10 dni przed badaniem,
- leki przeciwcukrzycowe, powinny zmienić dawkowanie po konsultacji z lekarzem rodzinnym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 89-532-45-60 pn. - pt. w godz. 8.00-18.00.