

**MOVIPREP**  
**PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII**

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiednio stosując środki przeczyszczające (**MOVIPREP**). Prawidłową reakcją na lek będzie biegunka.

**Ważne zalecenia dietetyczne:**

- 7 dni przed badaniem:
  - nie spożywać warzyw i owoców z pestkami (kiwi, maliny, truskawki, pomidory, itd.), ziaren (siemię lniane, mak), pieczywa z ziarnem, napojów gazowanych;
- 2 dni przed badaniem:
  - dieta półpłynna, lekkostrawna, tj. ryż, makaron, jasne pieczywo, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane, herbata;
  - kolacja lekkostrawna: jasne pieczywo, ser, chuda wędlina, herbata;
- 1 dzień przed badaniem:
  - nie należy pić: alkoholu, herbaty ani kawy;
  - nie można spożywać żadnych posiłków stałych. Dozwolona jest tylko woda, jasne, klarowne soki niegazowane, jasny kisiel, poprzedzony rosół;
- Dzień badania:
  - nie spożywać żadnych pokarmów do czasu badania!
  - dwie godziny przed badaniem nic nie pić!

**Jak przygotować preparat MOVIPREP:**

- W 1 litrze wody należy rozpuścić 1 saszetkę A i 1 saszetkę B. Wypić w ciągu 30-60 min. Następnie wypić 1 l wody w ciągu kolejnej godziny. Z drugą dawką postąpić tak samo.

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Do godz. 10.00	1.dawka: godz. 20.00 2.dawka: godz. 22.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	Bez leku przeczyszczającego Można pić wodę

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Godz. 10.00-14.00	1.dawka: godz. 20.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	2.dawka: godz. 5.00

Schemat dawkowania	Godz. badania	Przyjmowanie preparatu	
		Dzień przed badaniem	Dzień badania
	Po godz. 14.00	1.dawka: godz. 20.00 Dodatkowo wypić 2 litry wody	2.dawka: godz. 9.00

**Osoby przyjmujące:**

- regularnie leki zażywają normalnie poranną dawkę,
- leki wpływające na krzepliwość krwi (np.: Acenocumarol, Plavix, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Warfin, Sintrom, Acard, Polocard) po konsultacji z lekarzem rodzinnym powinny odstawić je na kilka dni,
- żelazo powinny odstawić je na 10 dni przed badaniem,
- leki przeciwcukrzycowe, powinny zmienić dawkowanie po konsultacji z lekarzem rodzinnym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 89-532-45-60 pn. - pt. w godz. 8.00-18.00.